

Les consommateurs peuvent jouer un rôle dans la prévention de préjudices associés aux accidents liés à la médication.

Bulletin de Médicamentssécuritaires.ca

Volume 14 • Numéro 9 • Le 4 octobre 2023

Vous utilisez Ozempic? Ce que vous devez savoir avant de subir une intervention chirurgicale ou médicale

Médicamentssécuritaires.ca a appris qu'une personne prenait de l'Ozempic (sémaglutide) pour perdre du poids. Une semaine avant l'intervention médicale prévue, cette personne a cessé de prendre ce médicament, comme il lui avait été recommandé. Elle n'a pas non plus mangé d'aliments solides pendant les 12 heures précédant l'intervention. Cependant, au réveil, après l'opération, elle a vomi une grande quantité de nourriture. Heureusement, elle a reçu rapidement un traitement qui a permis d'éviter tout préjudice.

Médicamentssécuritaires.ca a appris qu'une personne prenait de l'Ozempic (sémaglutide) pour perdre du poids. Une semaine avant l'intervention médicale prévue, cette personne a cessé de prendre ce médicament, comme il lui avait été recommandé. Elle n'a pas non plus mangé d'aliments solides pendant les 12 heures précédant l'intervention. Cependant, au réveil, après l'opération, elle a vomi une grande quantité de nourriture. Heureusement, elle a reçu rapidement un traitement qui a permis d'éviter tout préjudice.

Marques de médicaments (nom générique)

Ozempic, Rybelsus (sémaglutide)

Trulicity (dulaglutide)

Victoza, Saxenda (liraglutide)

Adlyxine, Soliqua (lixisénatide)

Médicamentssécuritaires.ca donne les conseils suivants pour réduire le risque d'aspiration chez les patients qui prennent de l'Ozempic ou des médicaments apparentés et qui se préparent à une intervention ou à une chirurgie :

- Si vous avez un rendez-vous avant l'intervention, apportez tous vos médicaments. Dites à votre équipe soignante que vous utilisez l'un des médicaments énumérés dans l'encadré ci-dessus. Demandez quelles mesures peuvent être prises avant et pendant l'intervention pour réduire le risque d'aspiration. Par exemple, votre équipe peut vous demander de :
 - cesser de prendre le médicament plus tôt que ce qui est habituellement prescrit;
 - modifier votre régime alimentaire, par exemple ne boire que des liquides clairs pendant les 24 heures précédant l'intervention.
- À votre arrivée, le jour de l'intervention ou de la chirurgie, rappelez à votre équipe soignante que vous utilisez l'un de ces médicaments. Votre équipe pourra prendre les mesures nécessaires pour gérer le risque encouru.

Ce bulletin a été développé en collaboration avec la Coalition pour de meilleurs médicaments et Patients pour la sécurité des patients du Canada.

Les recommandations sont partagées avec les prestataires de soins de santé par l'entremise des bulletins de sécurité de l'ISMP Canada, afin que des changements puissent être faits de manière collaborative.

Ce bulletin contient de l'information sur l'utilisation sécuritaire des médicaments. À vocation non commerciale, le bulletin n'est pas assujéti à la Loi canadienne anti-pourriel.

Bulletin: www.medicamentssecuritaires.ca – **Signaler une erreur:** www.erreurmed.ca

© Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada 2023. Tous droits réservés.